

**XGEVA<sup>®</sup>**  
(denosumab)

# **XGEVA**

Posologia,  
somministrazione  
e controllo della  
calcemia

**AMGEN**

## POSOLOGIA

La dose raccomandata è **120 mg** somministrati come **iniezione sottocutanea singola**, una volta **ogni 4 settimane** nella **coscia**, nell'**addome** o nella parte **superiore del braccio**.<sup>1</sup>

## PRECAUZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE

**Prima della somministrazione**, la soluzione di XGEVA deve essere **ispezionata visivamente**. La soluzione può contenere tracce di particelle proteinacee da traslucide a bianche. Non iniettare la soluzione se è torbida o presenta un'alterazione del colore.<sup>1</sup>

**Non agitare**.<sup>1</sup>

Per evitare problemi nel sito di iniezione, lasciare che il flaconcino raggiunga la **temperatura ambiente** (fino a 25°C) prima dell'iniezione e **iniettare lentamente**.<sup>1</sup>

Deve essere iniettato l'**intero contenuto** del flaconcino.<sup>1</sup>

Per la somministrazione di XGEVA è raccomandato un **ago di acciaio calibro 27**.<sup>1</sup>

Il **flaconcino non** deve essere **riutilizzato**. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.<sup>1</sup>

## CONTROLLO DELLA CALCEMIA

La supplementazione di almeno 500 mg di calcio e 400 UI di vitamina D al giorno è necessaria in tutti i pazienti, tranne nel caso in cui sia presente ipercalcemia.<sup>1</sup>



L'**ipocalcemia** pre-esistente deve essere corretta **prima dell'inizio della terapia con XGEVA**.<sup>1</sup>



Il **monitoraggio** dei livelli di **calcio** deve essere effettuato **prima** della dose iniziale di **XGEVA, entro le due settimane successive** alla dose iniziale, nel caso si manifestino sintomi sospetti di **ipocalcemia**.<sup>1</sup>



Un **monitoraggio aggiuntivo** dei livelli di **calcio** deve essere considerato durante la terapia **nei pazienti con fattori di rischio per l'ipocalcemia**, o se diversamente indicato sulla base della condizione clinica del paziente.<sup>1</sup>



I **pazienti** devono essere incoraggiati a **riferire i sintomi indicativi di ipocalcemia**.<sup>1</sup>

**XGEVA**<sup>®</sup>  
(denosumab)

Per saperne di più sull'incidenza e l'impatto degli SRE (eventi correlati all'apparato scheletrico) visita i contenuti presenti su [www.DoctorAmgen.it](http://www.DoctorAmgen.it)

## **BIBLIOGRAFIA**

1. XGEVA, Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

### **XGEVA**

Confezione da 1 flaconcino da 120 mg - prezzo al pubblico: € 515,70\*

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ortopedico, urologo, radioterapista ed ematologo (RRL) in vigore dal 15 febbraio 2020

Classe A PT/PHT

\*A tale prezzo vanno applicate le riduzioni temporanee previste dalla normativa vigente.

## **RCP disponibile tramite QR code o link a seguire:**

[https://dcgiis2p8dm4s.cloudfront.net/f160f061-6009-4364-9217-c0b9a88f290c/679c03cd-9cd1-43e9-b823-005ab280ff2e/679c03cd-9cd1-43e9-b823-005ab280ff2e\\_source\\_v.pdf](https://dcgiis2p8dm4s.cloudfront.net/f160f061-6009-4364-9217-c0b9a88f290c/679c03cd-9cd1-43e9-b823-005ab280ff2e/679c03cd-9cd1-43e9-b823-005ab280ff2e_source_v.pdf)



Pubblicità rivolta agli operatori sanitari depositata in AIFA il 19/07/2023. VIETATA LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO. Cod. ITA-162X-0723-80009 - RCP incluso

**AMGEN**